arXiv:1510.00874v1 [math.RT] 3 Oct 2015

Рост обобщенных алгебр Темперли-Либа

13.11.2008

Введение

Алгебры Темперли-Либа и их $*$-представления изучались в ряде работ ([1], [3] и др.) в связи с моделями статистической физики. В [6] были введены обобщенные алгебры Темперли-Либа и среди них выделены конечномерные алгебры, связанные с графами A_n, D_n, E_n и др.

В статье изучается рост обобщенных алгебр типа Темперли-Либа $TL_{\Gamma,\tau}$. Изучаются их размерности или, если алгебра бесконечномерная, рост.

1 Класс алгебр TL_Γ

Определение 1.1. *Пусть (W,S) является системой Кокстера с матрицей Кокстера $M=(m_{ij})_{i,j}$ и $q\in\mathbb{C}$. Тогда алгеброй Гекке $H_{W,S}$ будем называется унитальная ассоциативная алгебра над $\mathbb{C}$ порожденная образующими t_s, $s\in S$ и соотношениями: $t_s^2=(q-1)t_s+q$ где $s\in S$, $q\in\mathbb{C}$ и $t_rt_st_r\cdots=t_st_rt_s\ldots$ где в каждой части равенства содержится m_{ij} множителей, $r,s\in S$, $r\neq s$.*

$$H_{W,S}=\mathbb{C}\Big\langle t_1,\ldots,t_n \mid t_k^2=(q-1)t_k+q,\ (t_it_j)^{[\frac{m_{ij}}{2}]}t_i^{\sigma_{m_{ij}}}=(t_jt_i)^{[\frac{m_{ij}}{2}]}t_j^{\sigma_{m_{ij}}}\Big\rangle$$

Определение 1.2. *Обобщенной алгеброй Темперли-Либа $TL_{W,S}$, ассоциированной с системой Кокстера (W,S) с графом Γ будем называть фактор-алгебру алгебры Гекке $H_{W,S}$, которая профакторизована по идеалу $I(\Gamma)$ порожденному элементами $(t_it_j)^{[\frac{m_{ij}}{2}]}t_i^{\sigma_{m_{ij}}}$, где (i,j) ребро в Γ.*

В дальнейшем обобщенную алгебру Темперли-Либа $TL_{W,S}$, ассоциированную с системой Кокстера (W,S) с графом Γ будем обозначать через $TL_{\Gamma,\tau}$, где $\tau\in\mathbb{C}$ соответствующий параметр или TL_Γ и говорить, что она имеет тип Γ. Также всюду ниже будем считать, что Γ — связный неориентированный граф.

Утверждение 1.1. *Размерность и рост алгебры $TL_{\Gamma,\tau}$ не зависят от τ.*

Доказательство. Пусть Γ_n — связный неориентированный граф, $V\Gamma_n=n$. Достаточно показать, что старшие слова базиса Гребнера алгебры TL_{Γ_n} не зависят от τ. Доказательство проведем по индукции.

Напомним, что базисом Гребнера идеала I называется множество элементов этого идеала $G\subset I$ такое, что для всякого $g\in I$ старшее слово g содержит в качестве подслова одно из старших слов элементов множества G. Базис Гребнера G называется минимальным, если никакое его собственное подмножество не является базисом Гребнера. Алгоритм построения минимального базиса Гребнера в идеале, порожденном конечным множеством элементов свободной алгебры, состоит из трех шагов: нормировка, редукция и композиция.

Предположим, что для алгебры TL_{Γ_n} утверждение верно (основание индукции приведено ниже в примерах). Соединим ребром граф Γ_n с новой $n+1$-й вершиной (будем считать, что $(n,n+1)\in E\Gamma_n$). Положим $\Gamma_{n+1}=\Gamma_n\cup\{n+1\}$. Тогда

алгебра $TL_{\Gamma_{n+1}}$ будет отличаться от TL_{Γ_n} соотношениями $(t_nt_{n+1})^{[\frac{m_{ij}}{2}]}t_n^{\sigma_{m_{ij}}} = 0$, $(t_{n+1}t_n)^{[\frac{m_{ij}}{2}]}t_{n+1}^{\sigma_{m_{ij}}} = 0$ и $t_it_{n+1} = t_{n+1}t_i$ для всех $i = 1, \ldots, n-1$. Следовательно, $(t_nt_{n+1})^{[\frac{m_{ij}}{2}]}t_n^{\sigma_{m_{ij}}}$, $(t_{n+1}t_n)^{[\frac{m_{ij}}{2}]}t_{n+1}^{\sigma_{m_{ij}}}$ и $t_it_{n+1} - t_{n+1}t_i$ $(i = 1, \ldots, n-1)$ содержатся в базисе Гребнера алгебры $TL_{\Gamma_{n+1}}$, т.е старшие слова в этих базисных элементах не зависят от τ. Но тогда по индуктивному предположению старшие слова новых элементов базиса Гребнера алгебры $TL_{\Gamma_{n+1}}$ не будут зависеть от τ.

□

2 Конечномерные алгебры TL_Γ

2.1 $TL_{A_n,\tau}$ $(n \geq 2)$

Рассмотрим алгебру TL_{A_n}, ассоциированную с графом Дынкина A_n $(n \geq 2)$



Алгебры $TL_{A_n,\tau}$ конечномерные как фактор-алгебры конечномерных алгебр Гекке, $\dim TL_{A_n} = \dfrac{1}{n+2}\binom{2n+2}{n+1}$ (см., например, [3]).

2.2 TL_{D_n} $(n \geq 4)$

Рассмотрим граф Дынкина D_n $(n \geq 4)$



Алгебра $TL_{D_n,\tau}$ конечномерная, так как при $\tau = \frac{1}{4}$ является фактор-алгеброй конечномерной алгебры Гекке, ассоциированной с графом D_n (см. например, [2]). Так $\dim TL_{D_4} = 48$, $\dim TL_{D_5} = 167$, $\dim TL_{D_6} = 593$, $\dim TL_{D_7} = 2144$.

2.3 TL_{E_n} $(n \geq 6)$

Рассмотрим граф E_n $(n \geq 6)$



Алгебры $TL_{E_n,\tau}$ при $n = 6, 7, 8$ конечномерные, так как при $\tau = \frac{1}{4}$ являются фактор-алгебрами соответствующих конечномерных алгебр Гекке (см. например,

[2]). Так $\dim TL_{E_6} = 662$, $\dim TL_{E_7} = 2670$ и $\dim TL_{E_8} = 10846$. Граф E_9 совпадает с расширенным графом Дынкина $\widetilde{E}_8$. Алгебры $TL_{E_n,\tau}$ при $n \geq 9$ также конечномерные (см. [6]). Так $\dim TL_{E_9,\tau} = 43409$.

Положим $m_{ij} = 4$ и $\sigma_{m_{ij}} = 0$ при $(i,j) \in E\Gamma$. Таким образом, мы будем рассматривать обобщенные алгебры Темперли-Либа с соотношениями

$$\begin{cases} p_ip_jp_ip_j = \tau p_ip_j, & \text{если } (i,j)_4 \in E\Gamma; \\ p_jp_ip_jp_i = \tau p_jp_i, & \text{если } (i,j)_4 \in E\Gamma; \\ p_ip_jp_i = \tau_i p_i, & \text{если } (i,j) \in E\Gamma; \\ p_jp_ip_j = \tau_i p_j, & \text{если } (i,j) \in E\Gamma; \\ p_ip_j = p_jp_i, & \text{если } (i,j) \notin E\Gamma. \end{cases}$$

2.4 TL_{B_n} $(n \geq 2)$

Рассмотрим алгебру TL_{B_n}, ассоциированную с графом B_n



Известно, что алгебры типа B конечномерные ([2], [6]). Например, $\dim TL_{B_2} = 7$, $\dim TL_{B_3} = 24$, $\dim TL_{B_4} = 83$, $\dim TL_{B_5} = 293$.

2.5 TL_{F_n} $(n \geq 4)$

Рассмотрим алгебру TL_{F_n}, ассоциированную с графом F_n



Известно, что алгебры типа F конечномерные ([2], [6]). Например, $\dim TL_{F_4} = 106$, $\dim TL_{F_5} = 464$, $\dim TL_{F_6} = 2003$.

2.6 TL_{H_n} $(n \geq 2)$

Пусть теперь $0 \leq \tau_1, \tau_2 \leq 1$, $m_{ij} = 4$ и $\sigma_{m_{ij}} = 1$ при $(i,j) \in E\Gamma$. Таким образом, мы будем рассматривать обобщенные алгебры Темперли-Либа с соотношениями

$$\begin{cases} p_ip_jp_ip_jp_i = \tau_1 p_ip_jp_i - \tau_2 p_i, & \text{если } (i,j)_5 \in E\Gamma; \\ p_jp_ip_jp_ip_j = \tau_1 p_jp_ip_j - \tau_2 p_j, & \text{если } (i,j)_5 \in E\Gamma; \\ p_ip_jp_i = \tau_i p_i, & \text{если } (i,j) \in E\Gamma; \\ p_jp_ip_j = \tau_i p_j, & \text{если } (i,j) \in E\Gamma; \\ p_ip_j = p_jp_i, & \text{если } (i,j) \notin E\Gamma. \end{cases}$$

Рассмотрим алгебру TL_{H_n}, ассоциированную с графом H_n



Известно ([2], [6]), что алгебры типа H конечномерные. Например, $\dim TL_{H_2} = 9$, $\dim TL_{H_3} = 44$, $\dim TL_{H_4} = 195$, $\dim TL_{H_5} = 804$.

2.7 $TL_{\widetilde{G}_2}$ и $TL_{l_2(p)}$ $(p = 5,\ p \geq 7)$

Рассмотрим алгебру $TL_{\Gamma,\tau}$, ассоциированную с графом Γ, где Γ — один из графов $l_2(p)$ при $p = 5$, $p \geq 7$ или $\widetilde{G}_2$

Элементарные вычисления дают $\dim TL_{\widetilde{G}_2} = 11$ и $\dim TL_{l_2(p)} = 2p-1$ при $p = 5$, $p \geq 7$.

3 Алгебры TL_Γ полиномиального роста

Пусть $\mathcal{A}$ — конечно порожденная ассоциативная алгебра и $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ — семейство его конечномерных подпространств. Говорят, что на $\mathcal{A}$ задана калибровка, если для любого $V \in \mathcal{K}(\mathcal{A})$ определена последовательность вложенных конечномерных подпространств

$$V^{(1)} \subseteq V^{(2)} \subseteq V^{(3)} \subseteq \ldots,\ V^{(n)} \in \mathcal{K}(\mathcal{A}),$$

удовлетворяющая следующему условию: если $V^{(k)} \subseteq W^{(m)}$, то для любого $n \in \mathbb{N}$ $V^{(kn)} \subseteq W^{(mn)}$. С каждым $V \in \mathcal{K}(\mathcal{A})$ связана функция роста $d_V(n) = \dim V^{(n)}$.

На множестве таких функций определяются отношения предпорядка и эквивалентности: $f \leq g$ тогда и только тогда, когда существуют такое $m \in \mathbb{N}$ и $c > 0$, что $f(n) \leq g(mn)$ для всех $n \in \mathbb{N}$; $f \sim g$ тогда и только тогда, когда $f \leq g$ и $g \leq f$. Класс эквивалентности f называется ростом f и обоначается $[f]$.

Для каждого конечномерного пространства V алгебры $\mathcal{A}$ положим $V^{(n)} = V + V^1 + \cdots + V^n$. Такая калибровка определяет рост алгебры $\mathcal{A}$.

Все многочлены одинаковой степени d имеют одинаковый рост $[n^d]$, который называется полиномиальным степени d. Если $[f] \leq [n^d]$ для некоторого d, то рост f считается полиномиальным. Рост $[2^n]$ называется экспоненциальным.

Понятие роста определяется для любой монотонной функции, для алгебр и групп оказывается инвариантным понятием.

3.1 $TL_{\widetilde{A}_n,\tau}$ $(n \geq 3)$

Рассмотрим теперь расширенный граф Дынкина $\widetilde{A}_n$ $(n \geq 3)$



Известно ([2]), что группавая алгебра Кокстера, связанная с графом $\widetilde{A}_n$ бесконечномерна и имеет полиномиальный рост. Покажем, что алгебра и $TL_{\widetilde{A}_n}$ бесконечномерна и имеет линейный рост.

Рассмотрим алгебру $TL_{\widetilde{A}_n}$, ассоциированную с графом $\widetilde{A}_n$ ($n \geq 3$). Так как максимальная длина старшего слова элементов базиса Гребнера алгебры $TL_{\widetilde{A}_n}$ равна n, то вершинами графа роста алгебры $TL_{\widetilde{A}_n}$ будут нормальные слова длины $n-1$. Обозначим через S_{n-1} множество старших слов базиса Гребнера алгебры $TL_{\widetilde{A}_n}$ длины $n-1$, т.е. $S_{n-1} = \bigcup_{i_1,\ldots,i_{n-1}} \prod_{k=1}^{n-1} p_{i_k}$. Тогда граф роста будет иметь $n^{n-1} - |S_{n-1}|$ вершин.

Предположим, что алгебра $TL_{\widetilde{A}_n}$ имеет рост отличный от линейного. Тогда её граф роста будет содержать не менее двух циклов соединенных путем. Обозначим через l_1, l_2 два минимальных цикла, которые соединеены путем. Пусть t_1 — путь от l_1 к l_2, а t_2 — путь от l_2 к l_1. Обозначим через l_3 минимальный цикл, соединяющий циклы l_1 и l_2, который содержит пути t_1 и t_2. Тогда для любых $q_1, q_2 \in l_3$ найдутся образующие p_{i_1} и p_{i_2} такие, что $q_1 p_{i_1} = p_{i_2} q_2$.

Базис Гребнера алгебры $TL_{\widetilde{A}_n}$ содержит соотношения $p_1 p_n p_1 - \tau p_1$ и $p_n p_1 p_n - \tau p_n$, тогда $|Vl_i| = n$ при $i = 1, 2, 3$. Но граф роста алгебры $TL_{\widetilde{A}_n}$ не может иметь более двух циклов длины n. Тогда существуют такие вершины $q_1, q_2, q_3 \in l_3$ и образующие p_{i_1}, p_{i_2}, p_{i_3}, p_{i_4} для которых выполняются равенства $q_1 p_{i_1} = p_{i_2} q_2$ и $p_{i_4} q_2 = q_3 p_{i_3}$, но тогда $TL_{\widetilde{A}_n}$ имеет линейный рост.

Например, базис Гребнера алгебры $TL_{\widetilde{A}_3}$ состоит из элементов $\{p_1^2 - p_1,\ p_2^2 - p_2,\ p_3^2 - p_3,\ p_1p_2p_1 - \tau p_1,\ p_2p_1p_2 - \tau p_2,\ p_2p_3p_2 - \tau p_2,\ p_3p_2p_3 - \tau p_3,\ p_1p_3p_1 - \tau p_1,\ p_3p_1p_3 - \tau p_3\}$, а граф роста имеет вид



3.2 $TL_{\widetilde{D}_n}$ $(n \geq 4)$

Рассмотрим алгебру $TL_{\widetilde{D}_n}$, ассоциированную с графом $\widetilde{D}_n$ ($n \geq 4$)



Известно ([2]), что группавая алгебра Кокстера, связанная с графом $\widetilde{D}_n$ бесконечномерна и имеет полиномиальный рост. Аналогично пункту 3.1 можно показать, что и алгебра $TL_{\widetilde{D}_n,\tau}$ бесклнечномерна и имеет линейный рост.

3.3 $TL_{\widetilde{E}_6}$ и $TL_{\widetilde{E}_7}$

Рассмотрим граф Дынкина $\widetilde{E}_6$



Известно ([2]), что группавая алгебра Кокстера, связанная с графами $\widetilde{E}_6$ и $\widetilde{E}_8$ бесконечномерны и имеет полиномиальный рост. Аналогично пункту 3.1 можно показать, что алгебры $TL_{\widetilde{E}_6,\tau}$ и $TL_{\widetilde{E}_7,\tau}$ бесклнечномерны и имеют линейный рост.ый рост.



3.4 $TL_{\widetilde{A}_1}$

Рассмотрим алгебру $TL_{\widetilde{A}_1}$, ассоциированную с графом $\widetilde{A}_1$



Алгебра $TL_{\widetilde{A}_1}$ задается соотношениями

$$TL_{\widetilde{A}_1} = \mathbb{C}\Big\langle p_1, p_2 \mid p_k^2 = p_k^* = p_k,\ k = 1, 2\Big\rangle.$$

Так как число элементов линейного базиса алгебры $TL_{\widetilde{A}_1}$ фиксированной длины большей единицы равно двум, то она имеет линейный рост ([2]).

3.5 $TL_{\widetilde{F}_n}$ $(n \geq 6)$

Рассмотрим алгебру $TL_{\widetilde{F}_n}$, ассоциированную с графом $\widetilde{F}_n$



Имеет линейный рост.

3.6 $TL_{\widetilde{B}_n}$ $(n \geq 4)$

Рассмотрим алгебру $TL_{\widetilde{B}_n}$, ассоциированную с графом $\widetilde{B}_n$



Имеет линейный рост.

3.7 $TL_{l_3(s)}$ $(s \geq 6)$

Рассмотрим алгебру $TL_{l_3(p)}$, ассоциированную с графом $l_3(p)$ $(p \geq 6)$



Имеет линейный рост.

3.8 $TL_{\widetilde{C}_2}$

Рассмотрим алгебру $TL_{\widetilde{C}_2}$, ассоциированную с графом $\widetilde{C}_2$



Известно ([2]), что алгебра $TL_{\widetilde{C}_2}$ имеет полиномиальный рост. Граф роста для алгебры $TL_{\widetilde{C}_2}$ не содержит более одного цикла, соединенного путем, а значит его рост линейный. Граф роста имеет вид



Базис Гребнера алгебры $TL_{\widetilde{C}_2}$ состоит из элементов $\{p_1^2 - p_1,\ p_2^2 - p_2,\ p_3^2 - p_3,\ p_1p_2p_1p_2 - \tau p_1p_2,\ p_2p_1p_2p_1 - \tau p_2p_1,\ p_2p_3p_2p_3 - \tau p_2p_3,\ p_3p_2p_3p_2 - \tau p_3p_2,\ p_3p_1 - p_1p_3,\ p_2p_3p_2p_1p_3 - \tau p_2p_1p_3,\ p_1p_3p_2p_1p_3 - \tau p_1p_3p_2\}$.

3.9 $TL_{\widetilde{C}_n}$ $(n \geq 3)$

2. Рассмотрим алгебру $TL_{\widetilde{C}_n}$, ассоциированную с графом $\widetilde{C}_n$ $(n \geq 3)$



Известно ([2]), что алгебры типа $\widetilde{C}_n$ имеют линейный рост.

4 Алгебры TL_Γ экспоненциального роста

4.1

Рассмотрим алгебру TL_{K_6}, ассоциированную с графом K_6



Обозначим через $F = \mathbb{C}\left\langle x_1, x_2 \right\rangle$ свободную алгебру, порожденную двумя образующими. Положим $q_1 = p_2p_3p_4p_2p_1p_5$ и $q_2 = p_2p_3p_4p_2p_1p_6$. Линейный базис TL_{K_6} состоит из всевозможных слов, в которых не содержатся следующие подслова p_1^2, p_2^2, p_3^2, p_4^2, p_5^2, p_6^2, $p_1p_2p_1$, $p_2p_1p_2$, $p_2p_3p_2$, $p_3p_2p_3$, $p_2p_4p_2$, $p_4p_2p_4$, $p_2p_5p_2$, $p_5p_2p_5$, $p_2p_6p_2$, $p_6p_2p_6$, p_3p_1, p_4p_1, p_5p_1, p_6p_1, p_4p_3, p_5p_3, p_6p_3, p_5p_4, p_6p_4, p_6p_5, $p_3p_2p_1p_3$, $p_4p_2p_1p_4$, $p_4p_2p_3p_4$, $p_5p_2p_1p_5$, $p_5p_2p_3p_5$, $p_5p_2p_4p_5$, $p_6p_2p_1p_6$, $p_6p_2p_3p_6$, $p_6p_2p_4p_6$, $p_6p_2p_5p_6$, $p_1p_3p_2p_1$, $p_1p_4p_2p_1$, $p_1p_5p_2p_1$, $p_1p_6p_2p_1$, $p_3p_4p_2p_3$, $p_3p_5p_2p_3$, $p_3p_6p_2p_3$, $p_4p_5p_2p_4$, $p_4p_6p_2p_4$, $p_5p_6p_2p_5$, $p_1p_3p_4p_2p_1$, $p_1p_3p_5p_2p_1$, $p_1p_3p_6p_2p_1$, $p_1p_4p_5p_2p_1$, $p_1p_4p_6p_2p_1$, $p_1p_5p_6p_2p_1$, $p_3p_4p_2p_1p_3$, $p_3p_4p_5p_2p_3$, $p_3p_4p_6p_2p_3$, $p_3p_5p_2p_1p_3$, $p_3p_5p_6p_2p_3$, $p_3p_6p_2p_1p_3$, $p_4p_5p_2p_1p_4$, $p_4p_5p_2p_3p_4$, $p_4p_5p_6p_2p_4$, $p_4p_6p_2p_1p_4$, $p_4p_6p_2p_3p_4$, $p_5p_6p_2p_1p_5$, $p_5p_6p_2p_3p_5$, $p_5p_6p_2p_4p_5$, $p_4p_2p_1p_3p_4$, $p_5p_2p_1p_3p_5$, $p_5p_2p_1p_4p_5$, $p_5p_2p_3p_4p_5$, $p_6p_2p_1p_3p_6$, $p_6p_2p_1p_4p_6$, $p_6p_2p_1p_5p_6$, $p_6p_2p_3p_4p_6$, $p_6p_2p_3p_5p_6$, $p_6p_2p_4p_5p_6$, $p_1p_3p_4p_5p_2p_1$, $p_1p_3p_4p_6p_2p_1$, $p_1p_3p_5p_6p_2p_1$, $p_1p_4p_5p_6p_2p_1$, $p_3p_4p_5p_2p_1p_3$, $p_3p_4p_5p_6p_2p_3$, $p_3p_4p_6p_2p_1p_3$, $p_3p_5p_6p_2p_1p_3$, $p_4p_5p_6p_2p_1p_4$, $p_4p_5p_6p_2p_3p_4$, $p_4p_5p_2p_1p_3p_4$, $p_4p_6p_2p_1p_3p_4$, $p_5p_6p_2p_1p_3p_5$, $p_5p_6p_2p_1p_4p_5$, $p_5p_6p_2p_3p_4p_5$, $p_5p_2p_1p_3p_4p_5$, $p_6p_2p_1p_3p_4p_6$, $p_6p_2p_1p_3p_5p_6$, $p_6p_2p_1p_4p_5p_6$, $p_6p_2p_3p_4p_5p_6$, $p_1p_3p_4p_5p_6p_2p_1$, $p_3p_4p_5p_6p_2p_1p_3$, $p_4p_5p_6p_2p_1p_3p_4$, $p_5p_6p_2p_1p_3p_4p_5$, $p_6p_2p_1p_3p_4p_5p_6$.

Пусть $\varphi : F \longrightarrow G$ гомоморфизм $\varphi(x_i) = q_i$, где $G = \mathbb{C}\left\langle q_1, q_2 \right\rangle$ подалгебра алгебры $TL_{K_6,\tau}$. Так как ни одно из запрещенных слов не содержится во всевозможных комбинациях элементов q_1 и q_2, то φ является изоморфизмом. Следовательно, в алгебре $TL_{K_6,\tau}$ существует свободная подалгебра G порожденная двумя образующими, тогда $TL_{K_6,\tau}$ имеет экспоненциальный рост.

4.2

Рассмотрим граф



Соответствующая алгебра TL_Γ имеет экспоненциальный рост, так как у неё существует свободная подалгебра порожденная двумя образующими (например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_2p_1p_3p_2p_4p_3p_5p_2p_1p_6p_2p_3p_4p_5p_2p_1p_3p_2p_5p_6$ и $q_2 = p_2p_1p_3p_2p_4p_3p_6p_2p_1p_5p_2p_3p_4p_6p_2p_1p_3p_2p_5p_6$).

4.3

Рассмотрим граф



Соответствующая алгебра TL_Γ имеет экспоненциальный рост, так как у неё существует свободная подалгебра порожденная двумя образующими (например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_7p_6p_4p_3p_1p_2p_3p_4p_5p_6p_4p_3p_1p_2p_3p_4p_5$ и $q_2 = p_6p_4p_3p_1p_2p_3p_4p_5$).

4.4

Рассмотрим граф



Соответствующая алгебра TL_Γ имеет экспоненциальный рост, так как у неё существует свободная подалгебра порожденная двумя образующими (например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_2p_7p_3p_4p_5p_8p_7p_3p_2p_1p_4p_3$ и
$q_2 = p_2p_7p_3p_4p_5p_6p_8p_7p_3p_2p_4p_3p_5p_4p_7p_3p_2p_1p_8p_7p_3p_2p_4p_3p_5p_4p_6p_5p_7p_3p_2p_1p_4p_3$).

4.5

Рассмотрим граф



Соответствующая алгебра TL_Γ имеет экспоненциальный рост, так как у неё существует свободная подалгебра порожденная двумя образующими (например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_4p_5p_6p_8p_4p_1p_2p_5p_7p_8p_4p_8p_9p_4p_2p_3$ и $q_2 = r_1r_2$, где $r_1 = p_4p_5p_6p_7p_8p_9p_5p_4p_3p_5p_4p_6p_7p_8p_4p_1p_3p_7p_8p_9p_4p_2$ и
$r_2 = p_5p_7p_9p_1p_5p_4p_2p_8p_4p_6p_7p_4p_5p_7p_9p_4p_1p_3p_5p_7p_8p_4p_2p_3p_4p_5p_6p_8p_4p_1p_2p_3$).

4.6

Рассмотрим граф



Соответствующая алгебра TL_Γ имеет экспоненциальный рост, так как у неё существует свободная подалгебра порожденная двумя образующими (например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_2p_1p_3$ и $q_2 = p_2p_1p_3p_2p_1p_4p_3$).

4.7

Рассмотрим алгебру TL_Γ, ассоциированную с графом Γ



Алгебра TL_Γ имеет экспоненциальный рост, так как у неё существует свободная подалгебра порожденная двумя образующими (например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_2p_3p_1p_6p_5p_4p_3p_2p_4p_3p_5p_4$ и $q_2 = p_3p_6p_5p_4p_3p_2p_1p_7p_6p_5p_4p_3p_2p_4p_3p_5p_4$).

4.8

Рассмотрим алгебру TL_Γ, ассоциированную с графом Γ



Алгебра TL_Γ имеет экспоненциальный рост, так как у неё существует свободная подалгебра порожденная двумя образующими (например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_1p_2p_3p_4p_3$ и $q_2 = p_5p_4p_3p_1p_2p_3p_4p_3$).

4.9

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_2p_6p_5p_4p_3p_1p_5p_4p_3$ и $q_2 = p_2p_5p_4p_3p_1p_5p_4p_3$).

4.10

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_2p_5p_4p_3p_1p_2p_3p_2p_4p_3$ и $q_2 = p_1p_2p_3p_2p_4p_3$).

4.11

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_2p_1p_4p_3p_2p_5p_4p_3p_5p_4p_5p_6p_3$ и $q_2 = p_2p_4p_3p_5p_4p_5p_6p_3$).

4.12

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_3p_2p_1p_4p_3p_2p_1p_5p_4p_3p_2p_1p_6$ и $q_2 = p_3p_2p_1p_4p_3p_2p_1p_5p_6p_3p_2p_1p_4p_3p_2p_1p_6$).

4.13

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_2p_1p_3p_2p_4p_5$ и $q_2 = p_2p_3p_5p_2p_4p_5$).

4.14

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_1p_2p_3p_2p_1p_3p_2p_3$ и $q_2 = p_1p_2p_3$).

4.15

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_2p_1p_3p_2p_3p_2p_4p_3$ и $q_2 = p_2p_1p_3p_2p_2p_4p_3$).

4.16

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_2p_1p_3p_2p_3p_2p_1p_4p_2p_3$ и $q_2 = p_2p_1p_3p_2p_3p_4$).

4.17

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_1p_2p_3p_2p_1p_3p_2p_1p_3p_2p_3$ и $q_2 = p_1p_2p_3$).

4.18

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_1p_2p_1p_3p_2$ и $q_2 = p_1p_4p_3p_2p_1p_2p_1p_3p_2$).

4.19

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_1p_3p_2$ и $q_2 = p_1p_3p_2p_4p_3p_2p_1p_2p_3p_2p_1p_4p_3p_2$).

4.20

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_1p_3p_2$ и $q_2 = p_1p_3p_2p_1p_3p_4p_2$).

4.21

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_1p_3p_2$ и $q_2 = p_1p_3p_2p_3p_2p_1p_2p_3p_2$).

4.22

Рассмотрим алгебру



(например, можно взять подалгебру порожденную элементами $q_1 = p_1p_2p_1p_3p_4$ и $q_2 = p_1p_2p_4p_2p_4$).

5 Связь между ростом графа и ростом его подграфа.

Существует связь между ростом графа и ростом его подграфа.

Лемма 5.1. *Если к графу* Γ *добавить новую вершину и соединить её ребром с одной из вершин* Γ, *то размерность или рост соответствующей алгебры* TL_Γ *не уменьшается.*

Доказательство. Пусть Γ — связный неориентированный граф. Добавив к Γ вершину и соединив ребром с одной из вершин Γ, то получим новый граф Γ'. Но тогда $TL_{\Gamma,\tau}$ является подалгеброй $TL_{\Gamma',\tau}$ и $\dim TL_{\Gamma',\tau} \geq \dim TL_{\Gamma,\tau}$. □

Лемма 5.2. *Если в графе* Γ *соединить ребром любые две вершины, то размерность или рост соответствующей алгебры* TL_Γ *не уменьшается.*

Доказательство. Так как мы рассматриваем только простые графы без петель, то достаточно будет рассмотреть граф $\widetilde{A}_3$, полученный из A_3 добавлением нового ребра. Алгебра $TL_{A_3,\tau}$ конечномерная, а $TL_{\widetilde{A}_3,\tau}$ — бесконечномерная. □

Пусть x_1 произвольная точка графа Γ валентности m. Разделим множество вершин $V\Gamma$, которые соединены с вершиной x_1 ребром на два помножества $V_1\Gamma$ и $V_2\Gamma$. Построим новый граф Γ'. Возьмем вершину x_1 и новую вершину x_2 (где $x_2 \notin V\Gamma$) и соединим их ребром. Все вершины из $V_1\Gamma$ соединим с x_1, а вершины из $V_2\Gamma$ соединим с x_2. Остальные вешины соединим как в исходном графе Γ. Такую процедуру будем называть как сделать из точки ребро.

Лемма 5.3. *Если в графе* Γ *из точки сделать ребро, то размерность или рост соответствующей алгебры* TL_Γ *не уменьшается.*

Доказательство. Для доказательства достаточно рассмотреть граф $\widetilde{D}_5$, полученный из $\widetilde{D}_4$ прибавлением ребра вместо точки. Алгебры $TL_{\widetilde{D}_4,\tau}$ и $TL_{\widetilde{D}_5,\tau}$ бесконечномерны и имеют линейный рост. □

6 Основная теорема

Теорема 6.1. *Пусть* Γ *— связный неориентированный граф, тогда*

- *алгебра* TL_Γ *конечномерная тогда и только тогда, когда граф* Γ *совпадает с одним из графов* A_n, D_n, E_n, B_n, F_n, H_n, $\widetilde{G}_2$ *и* $l_2(p)$ *(*$p = 5$, $p \geq 7$*);*
- *алгебра* TL_Γ *имеет линейный рост тогда и только тогда, когда граф* Γ *совпадает с одним из графов* $\widetilde{A}_n$, $\widetilde{D}_n$, $\widetilde{E}_6$, $\widetilde{E}_7$, $\widetilde{A}_1$, $\widetilde{F}_n$, $\widetilde{B}_n$, $\widetilde{C}_n$ *и* $l_3(s)$ *(*$s \geq 6$*);*
- *алгебра* TL_Γ *имеет экспоненциальный рост тогда и только тогда, когда граф* Γ *не совпадает ни с одним из графов* A_n, D_n, E_n, $\widetilde{A}_n$, $\widetilde{D}_n$, $\widetilde{E}_6$, $\widetilde{E}_7$, B_n, F_n, H_n, $\widetilde{G}_2$, $l_2(p)$ *(*$p = 5$, $p \geq 7$*),* $\widetilde{A}_1$, $\widetilde{F}_n$, $\widetilde{B}_n$, $\widetilde{C}_n$ *и* $l_3(s)$ *(*$s \geq 6$*).*

Список литературы

[1] Temperley H.N.V. and Lieb E.H.*Relations between 'percolations' and 'colouring' problems and other graph theoretical problems associated with regular planar lattices: some exact results for the percolation problem* // J. Proc. Roy. Soc. London, Ser. A. – 1971. – Vol.322. – P.251–280.

[2] Н.Бурбаки *Группы и алгебры Ли. Часть 2. Группы Кокстера и системы Титса. Группы, порожденные отражениями. Системы корней* // М.: Мир, 1972

[3] V.F.Jones *Index for subfactor* // Invent Math. – 1983. – Vol.72. – P.1–15.

[4] R.M.Green *Cellular Algebras arising from Hecke Algebras of type* H_n // Mathematische Zeitschrift 229 (1998), 365-383

[5] R.M.Green *Generalized Temperley-Lieb Algebras and Decorated Tangles* // Journal of Knot Theory and its Ramifications 7 (1998), 155-171

[6] J.J.Graham *Modular representations of Hecke algebras and related algebras* // Ph.D. thesis, University of Sydney, 1995.

[7] В.А.Уфнаровский *Комбинаторные и ассимптотические методы в алгебре* // Современные проблемы математики. Фундаментальные направления, – т.57, – с.5–177 (1990).